

Gepersonaliseerde informatie voor de patiënt

Dit is Jos Pil!

En meneer Pil heeft zijn naam niet gestolen, want om medische redenen dient hij verschillende medicijnen te nemen. Het is voor meneer Pil dus enorm belangrijk dat hij weet wanneer hij welke medicatie moet nemen, en of die in combinatie genomen mag worden met zijn andere medicatie.



In de gepersonaliseerd informatie van Farmad kan Jos perfect lezen:

- waarvoor de medicatie dient
- welke eventuele bijwerkingen er kunnen optreden
- hoe vaak hij het medicijn dient in te nemen
- welke andere medicatie hij gebruikt, en of deze samen ingenomen mogen worden.
- ...

Bekijk hieronder hoe de gepersonaliseerde informatie voor de patiënt eruit ziet!

Asaflow tablet maagsapresistent 160 mg

Werking

■ Het werkzame middel

Het werkzame middel in dit geneesmiddel is **acetylsalicylzuur**. In elke tablet zit 160 mg acetylsalicylzuur.

■ Waar het medicijn voor is

Om te voorkomen dat een bloedvat verstopt raakt door een stolsel (een bloedprop). Hierdoor vermindert de kans op bijvoorbeeld een hartaanval of beroerte.

Bij kinderen wordt het gebruikt bij het syndroom van Kawasaki. Dit is een zeldzame aandoening met koorts, opgezette klieren en huiduitslag.

■ Hoe dit medicijn werkt

Zorgt er voor dat het langer duurt totdat het bloed stolt (een bloedverdunner).

Het remt ook ontstekingen, het vermindert pijn en verlaagt koorts.

■ Wanneer het begint te werken

De bloedverdunnende werking begint binnen een half uur.

Bijwerkingen

Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.

Er kunnen tijdens het gebruik maagklachten ontstaan. Het kan helpen om dit middel na wat eten in te nemen.

Sommige mensen (vooral ouderen) hebben een grotere kans op een zweer in de maag of darm. De arts kan een middel voorschrijven dat de maag en darm beschermt.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor:

- zwarte ontlasting of bloed bij de ontlasting. Dit kan wijzen op bloedverlies uit de maag of darm.

- overgevoeligheds-reacties. Te merken aan bijvoorbeeld jeuk, huiduitslag, benauwd zijn, zwellingen (van bijvoorbeeld gezicht, lippen, tong of handen) of een snelle pols

Voor u dit medicijn gaat gebruiken

■ Gebruik met uw andere medicijnen

Volgens onze gegevens gebruikt u nu de volgende geneesmiddelen:

- **Asaflow tablet 80 mg** (acetylsalicylzuur)
- **Atenolol tablet 50 mg Sandoz** (atenolol)
- **Lipitor tablet 20 mg** (atorvastatine)
- **Paracetamol tablet 1 gram Sandoz** (paracetamol)

We hebben gecontroleerd of Asaflow (acetylsalicylzuur) samen gaat met uw andere geneesmiddelen. U kunt deze geneesmiddelen samen gebruiken. Wij hebben geen extra adviezen voor u.

Als de gegevens niet kloppen of bij wijzigingen

Geef aan ons door als onze gegevens over uw geneesmiddel-gebruik niet kloppen. We passen deze dan aan.

Geef ook aan ons door als de dosering van uw geneesmiddelen verandert. Dit geldt ook als u stopt met het gebruik. En als u weer start met geneesmiddelen die u nog in huis heeft.

Als u andere geneesmiddelen gebruikt

Dit geneesmiddel kan wisselwerkingen hebben met andere middelen. Vraag daarom advies als u:

- geneesmiddelen zonder voorschrift bij de apotheek koopt
- geneesmiddelen van de drogist of supermarkt gebruikt
- middelen gebruikt zoals vitamines, kruidenmiddelen of homeopathie.

■ Gebruik bij uw andere ziekten of klachten

Niet gebruiken bij

Een overgevoeligheids-reactie na gebruik van sommige geneesmiddelen, namelijk bepaalde pijnstillers, bloedverdunners of middelen bij darmziekten. Overgevoeligheids-reacties zijn bijvoorbeeld huiduitslag, benauwdheid of zwelling van de mond of keel. Overleg dan eerst met de apotheker of arts.

Let op bij

- een bloeding in de maag of in de darmen. Ook als u deze in het verleden heeft gehad.
 - bloedarmoede door een tekort aan het enzym G6PD (een aangeboren afwijking). Dit middel kan namelijk een aanval uitlokken.
 - ziekten waarbij sneller bloedingen ontstaan en bloedingen langer duren. Door gebruik van dit middel is de kans op bloedingen groter.
 - vastgestelde leverproblemen
- Overleg hierover met de apotheker of arts.

Let ook op bij

- een hersenbloeding in het verleden. Overleg dan met de arts of u dit middel mag gebruiken.
- een zweer in de maag of darm. Of als u al last heeft van erge maagklachten zoals pijn of brandend maagzuur. De arts kan dan een middel voorschrijven dat de maag en darm beschermt. Gebruik dit middel dan niet zonder deze maag/darm beschermer.
- een ingreep, zoals het trekken van een kies of een (kleine) operatie. Overleg hierover met de (tand)arts.
- kinderen tot 16 jaar met windpokken of griep (influenza). De kans op erge bijwerkingen (syndroom van Reye) is dan namelijk hoger. Gebruik dit middel bij kinderen alleen na overleg met de arts.

■ Gebruik bij zwangerschap

U kunt dit geneesmiddel gebruiken tijdens de zwangerschap. Gebruik alleen niet meer dan 80 mg per dag. Overleg hierover met de arts of apotheker.

Niet van toepassing.

■ Gebruik bij borstvoeding

U kunt dit middel gebruiken als u borstvoeding geeft. Maar gebruik het alleen na overleg met de arts of apotheker.

Niet van toepassing.

Het gebruik van dit medicijn

De tablet heel doorslikken met een half glas water. Niet kauwen of fijn maken.

Voor een goede werking is het belangrijk dit middel elke dag in te nemen. Blijf dit middel gebruiken en

verander niet zelf de dosering. Stop nooit zonder overleg met de arts.

■ Gebruikelijke doseringen

Volwassenen: meestal 1 maal per dag 1 tablet. Soms 1 maal per dag 2 tabletten. Soms op de eerste dag(en) 1 maal per dag 2 tot 4 tabletten.

Kinderen: alleen op advies van de arts gebruiken. De dosering wordt in overleg met de arts vastgesteld.

■ Bij een vergeten dosering

Het advies hangt af van het tijdstip dat u er achter komt:

- Is het nog dezelfde dag? Neem de dosering dan alsnog in.
- Is het al de volgende dag? Sla dan de vergeten dosering over.

Andere adviezen

Gezond leven heeft een gunstige invloed op het beloop van hart- en vaatziekten. Daarom is het volgende belangrijk:

- eet gezond en gebruik niet te veel zout
- stop met roken
- neem voldoende lichaamsbeweging. Bijvoorbeeld elke dag een half uur normale dagelijkse beweging, zoals lopend of fietsend naar de winkel gaan.
- zorg voor voldoende ontspanning
- voor mannen geldt: drink niet meer dan 2 glazen alcohol per dag. Drink liever niet elke dag
- voor vrouwen geldt: drink niet meer dan 1 glas alcohol per dag. Drink liever niet elke dag
- afvallen bij overgewicht.

Kenmerken van dit medicijn

tabletten.

Bij vragen, of voor meer informatie

Overleg met de apotheker of arts bij vragen over het gebruik van dit geneesmiddel.

Uw ervaring met geneesmiddelen is waardevol voor anderen. Het kan helpen informatie over geneesmiddelen te verbeteren. Meld ervaringen met bijwerkingen daarom op: www.fagg.be. Meld andere ervaringen op: www.meldpuntgeneesmiddelen.be.

Wilt u meer weten over uw ziekte? Of er over praten met anderen? Uw apotheker, arts of patiënten-organisatie kan informatie geven.

Over deze medicijn-informatie

Deze informatie over uw geneesmiddel is voor u persoonlijk samengesteld. Daarom is deze niet geschikt voor andere mensen.

Deze informatie komt ook niet in de plaats van de bijsluiter van de fabrikant of aanwijzingen van de arts. Het is een selectie uit wat bekend is over dit geneesmiddel. Het bevat dus niet alle mogelijke waarschuwingen en bijwerkingen.

Merkt u verschillen op tussen de bijsluiter en deze informatie?

Vraag dan de apotheker of arts om meer uitleg.

Laatste wijziging in deze informatie: 18 februari 2016.

Informatie van de apotheek

Bedankt voor uw bezoek!